

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)

Suda Çözünür Bor (B) : % 10

KLOR İÇERMEMEKTEDİR.

- Bitkilerdeki bor noksanlığını giderir.
- Bor noksanlığından ortaya çıkan stresi kontrol altına alır.
- Sağlıklı bitki gelişimini destekler.
- Bitkideki RNA sentezini artırır.
- Bitkide döllenmeyi artırır.
- Bor noksanlığından dolayı ortaya çıkan deformasyonu giderir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN UYGULAMA (100 litre su ile/da)	TOPRAKTAN (Damlama Sulama ile cc/da)
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK	Kardeşlenme döneminden itibaren uygulanır.	75-100 cc	-
AYÇİÇEĞİ	Bitkilerini iki yapraklı dönemi ile çiçek gözü oluşma dönemi arasında uygulanır. Bu dönemde 10-15 gün arayla 2 defa uygulanır.	150-200 cc	200-250 cc
PAMUK	Koza oluşumundan önce uygulanır.	100-200 cc	500-750 cc
PATATES, ŞEKER PANCARI, HAVUÇ	Bitki boyunun 10-15 cm veya 4-5 yapraklı olduğu dönemde uygulanır.	100-150 cc	300-400 cc
FASULYE, NOHUT, MERCİMEK	Gelişim dönemi boyunca uygulanır.	100-150 cc	300-400 cc
DOMATES, BİBER, PATLICAN	Fideler 4-5 yapraklı olduğu dönemde ve 10 gün sonra 2. uygulama yapılır.	50 cc	75-150 cc
FINDIK, CEVİZ, ANTEP FISTIĞI	Çiçeklenmeden önce uygulanır.	100-150 cc	200-250 cc
SERT ÇEKİRDEKLİLER (ŞEFTALİ, KIRAZ, VIŞNE, KAYISI, ERİK VB.)	Erken ilkbaharda çiçeklenme öncesi gözlem uyanma aşamasında ve hasat sonrasında yaprak dökümünden önce uygulanır. Çiçeklenme döneminde uygulanmaz.	75-150 cc	150-250 cc
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER (ELMA, ARMUT, AYVA VB.)	Meyve gözleri patladığında, çiçeklenme sonrasında ve hasat sonrasında yapraklar dökülmeden önce uygulanır. Çiçeklenme döneminde uygulanmaz.	75-150 cc	150-250 cc
ZEYTİN	Çiçeklenmeden öncesi ve çiçeklenme sonrası olmak üzere iki uygulama yapılır.	100-150 cc	150-200 cc
NARENCİYE	Çiçeklenmeden önce ve hasattan sonra uygulanır.	100-150 cc	150-250 cc
BAĞ	Yaprak oluşumundan sonra çkek demetleri belirlediğinde ve dane tutumunda olmak üzere 2 defa uygulanır.	75 cc	100-150 cc
ÇİLEK	Beyaz göz döneminde uygulanır.	50-75 cc	150-200 cc
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Fide dikiminden sonra ve 15 gün sonra 2 uygulama yapılır.	75 cc	150-300 cc
YAPRAĞI YENEN SEBZELER (MARUL, KIVIRCIK, LAHANA VB.)	Şaşırtmadan veya çıkıştan 10 gün sonra uygulanır.	75 cc	150-300 cc
SOĞAN, SARIMSAK	Uygulamaya yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda, gerekirse 14 gün sonra 2. uygulama yapılır.	75 cc	200-300 cc
YEŞİL ALANLAR	Gelişime dönemi boyunca uygulanır.	50 cc	-
KANOLA	İlkbaharda gelişim başlangıcında 1. uygulama 10 gün sonra 2. uygulama yapılır.	75 cc	-
YONCA	Her biçimden sonra uygulanır.	100-150 cc	-
SERALARDA	Çıkıştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra 2 uygulama yapılır.	75 cc	-
MUZ	Çiçeklenmeden hasata kadar 3 hafta arayla damlama sulama yapılır.	-	150-200 cc

