

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% (w/w)
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 5,25
Ortho-Ortho EDDHA ile Şelatlı Demir	: % 4,5
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	: % 1,25
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	: % 0,7
Şelatının Stabil olduğu pH aralığı	: 3,5 - 10

Combi Majora tozsuz ve tamamı suda çözünür mikrogranüller bir gübredir

Bitkinin topraktan yeterince beslenemediği hallerde, stres koşullarında Combi Majora bitkinin iz element ihtiyacını karşılamaya yapraklardan başlar.

Combi Majora kullanıldığı tüm bitkilerde daha fazla tomurcuk ve çiçek oluşumu sağlayarak yüksek verim ve kaliteli mahsul elde edilmesini sağlar.

Combi Majora eksikliklerinde yaprak klorozuna, çiçek dökümüne, zayıf meyve gelişimine ve ufak meyveye yol açabilen mikro element ihtiyaçlarını karşılamada mükemmel sonuçlar verir.

Combi Majora alkali topraklarda yetiştirilen bitkiler ve onların özel demir ihtiyaçları için tavsiye edilir.

Combi Majora tüm sebze, meyve, sera alanları ve fidanlarda kullanılan, tamamı şelatlı mikro element kaynağıdır.

Fertiline®

EC FERTİLİZER
Demir (Fe-EDDHA), Mangan (Mn-EDTA) ve Çinko (Zn-EDTA) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Fertiline®
COMBI MAJORA



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% (w/w)
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 5,25
Ortho-Ortho EDDHA ile Şelatlı Demir	: % 4,5
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	: % 1,25
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	: % 0,7
Şelatının Stabil olduğu pH aralığı	: 3,5 - 10

KLOR İÇERMEMEKTEDİR.

**KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU**

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN (Damlama ve Yağmurlama sulama ile kg/da)	YAPRAKTAN UYGULAMA (100 litre su ile/gr)
SERA VE AÇIK ALAN SEBZELERİNDE (Biber, Domates, Patlıcan, Kavun, Karpuz ve Salatalık)	Fide toprağa tutunduktan sonra sezon boyunca	0,5 - 1	125 - 150
TÜM MEYVE AĞAÇLARINDA, BAĞLARDA	Meyve tutumundan itibaren sezon boyunca. Erken hasat edilen meyvelerde hasattan sonra	Sezon boyunca ağaç başına 30-60 gr	125 - 150
TARLA BİTKİLERİNDE (Buğday, Mısır, Tütün, Ayçiçeği, Çeltik, Pamuk vs.)	10 - 15 cm boya ulaştıktan sonra	1 - 2	125 - 150
ÇİLEK	Fide toprağa tutunduktan sonra başlayarak kardeşlenme ve hasat boyunca	1 - 2	125 - 150
SERALARDA, KESME ÇİÇEKLERDE, ÇİM ALANLARINDA	Gelişme döneminde 30 gün arayla 1 - 2 uygulama	1 - 2	125 - 150
YUMRULU BİTKİLERDE (Patates, Havuç, Şeker Pancarı, Soğan vb.)	İlk çapadan itibaren sezon boyunca	1 - 2	125 - 150