

**NPK FORMULASYONLARI**

- 20 - 20 - 20 + TE
- 18 - 18 - 18 + TE
- 12 - 6- 32 + TE
- 12 - 32- 6 + TE

- Damla sulama gübreleri suda tamamen çözünür.
- Düşük EC ve düşük pH değerine sahip hammaddelerden üretilmişlerdir.
- Tarımsal üretimi yapılan bir çok üründe güvenle kullanılabilir
- Damla sulama ile birlikte doğrudan toprağa uygulanır.
- Büyüme sezonu boyunca uygulama oranı 5 - 30 kg/ha/gün şeklinde uygulanabilir.
- Uygulama oranları bitki türüne ve ihtiyaca göre değişiklik gösterir.

**KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU**

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN UYGULAMA (kg/da)	YAPRAKTAN UYGULAMA (gr/da)
SERA VE AÇIK ALAN SEBZELERİ	ilk meyvelerden sonra 15- 20 gün aralıklarla	1 - 3	300 - 500
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER	3 - 4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	350 - 500
YUMRULU BİTKİLER	4 - 6 yapraklı olduğu dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	250 - 300
TÜM MEYVE AĞAÇLARI	Gelişmenin başlaması ile birlikte 2-3 tekrerrürde uygulanır.	1 - 4	400 - 600
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	5 - 6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	300 - 400
TÜM BAKLAGİLLER	5 - 6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	300 - 400
TAHILLAR	Kardeşlenme döneminde	-	250 - 300
YEŞİL ALANLAR	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 2 haftada bir uygulama	-	250 - 300