

YAPRAK GÜBRESİ FORMÜLASYONLARI

- Yaprak gübrelere tamamen suda çözünürdür.
- Bir çok üründe güvenle kullanılabilir.
- Forfor ağırlıklı olanlar çiçeklenme ve kök gelişimini artırır.
- Potasyum ağırlıklı olanlar ise depolama ve raf ömrünü uzatır.
- Dengeli formülasyonu ise gelişim periyodu boyunca uygulanabilir.

**KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU**

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN UYGULAMA (kg/da)	YAPRAKTAN UYGULAMA (gr/da)
SERA VE AÇIK ALAN SEBZELERİ	İlk meyvelerden sonra 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	300 - 500
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER	3 - 4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	200 - 250
YUMRULU BİTKİLER	4 - 6 yapraklı olduğu dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	400 - 600
TÜM MEYVE AĞAÇLARI	Gelişmenin başlaması ile birlikte 2-3 tekrerde uygulanır.	1 - 4	300 - 400
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	5 - 6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	300 - 400
TÜM BAKLAGİLLER	5 - 6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15 - 20 gün aralıklarla	1 - 3	200 - 250
TAHILLAR	Kardeşlenme döneminde	1 - 3	200 - 250
YEŞİL ALANLAR	Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 2 haftada bir uygulama	1 - 3	300 - 400