

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)

Suda Çözünür Potasyum Oksit : % 20

- İçeriğinde bulunan yoğun potasyum iyonları sayesinde bitkide gözlemlenen potasyum noksanlığını giderir.
- Hem yapraktan hemde kökten hızla alınır. Gövde çapını artırır.
- Meyve ağırlığını ve ürün miktarını artırır.
- Hem Floem'de hemde Ksilemde taşınır.
- Bitkinin gelişim döneminden itibaren olgunlaşma ve hasada kadar aşağıdaki dozlarda kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ, ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN (ml/da)	YAPRAKTAN UYGULAMA (100 litre su ile/ml)
AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Patlıcan, Biber,Fasulye, Salatalık vs.)	Meyve tutumundan hasada kadar	1500 - 2000	200 - 250
SERA VE ÖRTÜ ALTI SEBZELER	Meyve tutumundan hasada kadar	1500 - 2000	150 - 200
KAVUN , KARPUZ	Meyve tutumundan hasada kadar	1500 - 2000	200 - 250
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Renklenme başlangıcından hasada kadar	1000 - 1500	150 - 200
ELMA , ARMUT, KİRAZ, VİŞNE , KAYISI BADEM, FINDIK , CEVİZ , ŞEFTALİ , ANTEP FISTIĞI vs.	Meyve tutumundan hasada kadar	2000 - 2500	350 - 400
NARENCİYE , MUZ, ZEYTİN	Meyve tutumundan hasada kadar	2000 - 2500	350 - 400
BUĞDAY,MISIR, ÇELTİK, AYÇİÇEĞİ, ANASON vs.	Dane doldurma ve dane büyütme zamanı	-	200 - 250
BAĞ	Meyve tutumundan hasada kadar	1500 - 2000	250 - 300
ÇİLEK	Meyve tutumundan hasada kadar	1500 - 2000	250 - 300
ŞEKER PANCARI,PATATES , SOĞAN, TURP, HAVUÇ , SARIMSAK vs.	Yumru oluşumundan hasada kadar	1500 - 2000	250 - 300

