

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)

Toplam Azot (N)	: % 8
Nitrat Azotu (N)	: % 8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: % 12
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,1

- Yüksek oranda kalsiyum, bitkilerin ihtiyacı kadar ise bor ve amino asit içerir.
- Özel formülü sayesinde bitkide etkisini çok kısa sürede gösterir.
- İçeriğindeki kalsiyum sayesinde bitki hücre duvarlarının güçlenmesini sağlar.
- Ürünlerin raf ömrünü ve depolama süresini arttırır.
- Meyvelerin çatlamaya karşı direncini arttırır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI**TOPRAKTAN****Tohumların çimlenmesi ve fide köklendirmesinde:**

Tohum ekimiyle birlikte veya fideler şaşırtılmadan önce 3 lt/da dozunda Migg damlama sulama ile uygulanır. Bu uygulama yapılmadıysa fidelere verilecek can suyu içerisine 2.5 lt/da dozunda karıştırılarak fidelerin kök çukuruna verilir.

Sebzeler (domates, biber, Salatalık, patlıcan) çilek, karpuz, muz ve kesme çiçekçilikte:

Çiçek öncesi, çiçek sonrası, meyve oluşumu ve hasat öncesi dönemlerinde her seferinde 2,5 lt/da dozunda uygulanır.

Meyve ağaçlarında ve bağlarda: Çiçeklenmeden 10-15 gün önce 8 lt/da, yaz sürgünlerinin çıkışından 10-15 gün önce 8 lt/da ve hasattan 10-15 gün önce 5 lt/da olarak uygulanır.

Narenciyelerde:

Fidan dikiminde: Dikimden 5-6 gün sonra 100cc/fidan uygulanır.

1-2 yaş: birinci 100 cc ilkbaharda, ikinci 100cc 30-40 gün sonra uygulanır.

3-5 yaş: birinci 125 cc ilkbaharda sonrakiler 30-40 gün ara ile 3 defa uygulanır.

6 yaş üstü: birincisi çiçeklenmeden 10-15 önce, ikincisi haziran dökümünden veya yaz sürgünü çıkışından 10-15 gün önce olmak kaydıyla, her defasında 10 lt/da dozunda damlama sistemi ile verilir.

YAPRAKTAN

Narenciye; 400-500cc/100 lt. su İlk sürgün faaliyeti ve çiçeklenme sonrası 1 uygulama.

Bağ; 300-350cc/100 lt. su yapraklanma zamanı 1 dene tutumundan sonra 2 uygulama.

Pamuk; 250-300cc/da Taraklanmadan önce ve sonra 1 uygulama.

Sebzeler; 250-300cc/da Gelişme dönemi boyunca 2 uygulama.

Meyve Ağaçları; 300-350cc/100 lt. su Sürgün faaliyeti ile birlikte 2 haftada 1 uygulama.

Elma; 400-500cc/da Çiçeklenme sonrası 1-2 uygulama.

Patates; 200-300cc/da Yumur oluşma döneminde 2-3 uygulama.

Sera Ürünleri; 350-400cc/da Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 2 haftada 1 uygulama.

Domates; 400-500cc/da Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 2 haftada 1 uygulama.

Karpuz-Kavun; 300-350cc/da Çiçeklenmeden önce ve sonra 1 uygulama.

Şeker Pancarı; 200-300cc/da Yumur oluşma döneminde 2-3 uygulama.

Çilek; 350-400 cc/da Çiçeklenmeden önce ve sonra birer uygulama.

Yeşil Alanlar; 200-250 cc/da İlk bahardan itibaren 2-3 uygulama.

