

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)

Toplam Azot (N)	: % 10
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	: % 10
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: % 17

- Kalsiyum, hücre bölünmesinin düzenlenmesi ve hücrelerin uzamasında etkili olarak bitkinin büyümesini sağlar.
- Hücre duvarını sağlamlaştırarak bitkinin hastalıklara, kuraklığa, dona ve stres koşullarına karşı dayanımını artırır.
- Yeterince kalsiyum alamayan meyve ve sebzelerde çürüme ve çatlama meydana gelir.
- Elmada acı benek, domateste çiçek burnu çürüklüğü, bağda meyve büyümesi ve uç kararması, pamuk tarak dökümüne, sebzelerde erime ve çatlama önlemede, buğday, ayçiçeği ve şeker pancarında büyüme fizyolojisi için kullanılır.
- Kaliteli, raf ve depo ömrü uzun, nakliye hasarlarına dayanımı artıran bir besin elementidir.
- Uygulama sulamadan önce yapılmalı veya uygulamadan sonra su verilmelidir.

KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	DAMLAMA SULAMA (Da)	YAPRAKTAN UYGULAMA (100 litre su ile/mm)
DOMATES	Meyve tutumundan 10 gün sonra başlanır, 8-10 günlük aralarla 3-4 uygulama yapılır. Hasattan iki hafta öncesine kadar uygulama yapılabilir, ilk uygulama düşük dozda uygulanmalıdır.	0,5-1,5 lt/da 0,75-2,25 kg/da	100-400 ml 150-600 gr
HIYAR, BİBER, KABAK	Meyve tutumundan sonra başlanır ve 15 günlük aralarla hasattan 15 gün öncesine kadar devam eder.	0,5-1 lt/da 0,75-1,5 kg/da	300-500 ml 450-750 gr
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Marul, KARNABAHAAR, LAHANA, KEREVİZ, BRÜKSEL LAHANASI vb.)	Uygulama sebzelerin baş oluşturmamasından hemen sonra başlanır, bir hafta arayla birkaç uygulama yapılır. Kerevizde bitkinin iç kısmı iyice ıslatılır.	0,5-1 lt/da 0,75-1,5 kg/da	300-500 ml 450-750 gr
KARPUZ	Meyve tutumundan hemen sonra uygulamaya başlanır, 15 günlük aralarla hasata bir hafta kalana kadar uygulamaya devam edilir.	0,5-1 lt/da 0,75-1,5 kg/da	300-500 ml 450-750 gr
ÇİLEK	Yetiştirme sezonunda son 2-3 fungusit uygulamasıyla birlikte uygulanır.	0,5-1 lt/da 0,75-1,5 kg/da	300-500 ml 450-750 gr
BAĞ	Çiçeklenmeden önce başlanarak pestisit uygulamaları ile birlikte, üzümün yumuşamaya başlamasıyla birlikte 15 gün arayla birkaç uygulama.	0,5-1 lt/da 0,75-1,5 kg/da	500-750 ml 750-1115 gr
ELMA	Meyve tutumu başlangıcından başlanarak, hasada kadar en az 6-7 uygulama yapılır. Genellikle çeşidin kara -acı- leke hassasiyeti dikkate alınarak doz ve uygulama sayısı artırılabilir.	1-2 lt/da 1,49-3 kg/da	300-500 ml 445-750 gr
KİRAZ, VIŞNE	Hasattan yaklaşık 7-8 hafta önce başlanarak, 2 haftalık aralarla 3-4 defa hasat öncesi uygulama yapılır.	0,5-1 lt/da 0,75-1,5 kg/da	150-200 ml 225-300 gr
ŞEFTALİ, NEKTARİN	Meyve tutumundan sonra iki hafta arayla, hasattan bir hafta öncesine kadar uygulama yapılır.	0,1 lt/da 0-1,5 kg/da	300-500 ml 450-750 gr

**Elmada Kalsiyum Noksanlığı****Domateste Kalsiyum Noksanlığı**